

data oraz godzina przyjęcia i kod e-skierowania: _____

Prosimy o telefoniczne poinformowanie szpitala w przypadku nagłego zachorowania – wszystkie infekcje, lub niemożności stawienia się w wyznaczonym terminie przyjęcia z innych względów – telefony poniżej.

Szanowna Pani, Szanowny Panie, Szanowny Pacjencie,

Prosimy o skorzystanie z poniższych wskazówek, mających ułatwić Pani / Panu właściwe przygotowanie do pobytu na naszym Oddziale Chirurgicznym.

1. W wyznaczonym dniu przyjęcia do szpitala prosimy o zgłoszenie się bezpośrednio na Oddziale Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi na godzinę podaną powyżej pod nagłówkiem.
2. Po przejściu punktu kontrolnego (potwierdzenie na liście) prosimy Państwa o wjazd na Oddział, windą na lewo od wejścia głównego do szpitala (wejście „B”) na II piętro. Po wyjściu z windy na II piętrze proszę wejść na Oddział Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi oraz zgłosić się w dyżurce pielęgniarskiej oddziału.
3. Przy przyjęciu wymagane jest okazanie dokumentu tożsamości i kodu e-skierowania do szpitala.
4. Dopiero w dyżurce pielęgniarskiej dokonuje się właściwa procedura przyjęcia do szpitala.
5. W dniu przyjęcia prosimy Panią/ Pana o przybycie do szpitala **na czczo**.

UWAGA! Pozostanie na czczo nie dotyczy Pacjentów starszych, osłabionych, z leczonym nadciśnieniem. Tych Państwa prosimy o spożycie w domu lekkiego śniadania.

Pacjencie, w dniu przyjęcia przyjmij swoje stałe leki tak jak zwykle. Prosimy również Państwa o zabranie do szpitala zapasu przyjmowanych przez siebie leków na 7 dni. Leki prosimy dostarczyć w oryginalnych opakowaniach z widocznym numerem serii oraz datą ważności.

UWAGA!!! Wyjątek! Prosimy o niezazywanie:

- a. Leków używanych w celu kontroli glikemii z grupy agonistów GLP-1, stosowanych w iniekcji 1 x w tygodniu, zawierających duleglutyd, semaglutyd, tirzepatyd, eksenatyd, liraglutyd (Mounjaro, Saxenda, Victoza, Ozempic, Wegovy, Bydureon).

UWAGA!!! Leki te powinno się odstawić co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą przyjęcia do szpitala; odstawienie tych leków musi uwzględniać wskazania do ich stosowania i w razie wątpliwości odbywać się **w porozumieniu z diabetologiem prowadzącym lub lekarzem POZ**, z zastosowaniem w razie konieczności ew. zmiany leczenia na insulinoterapię okołoperacyjną.

Pacjenci leczeni agonistami GLP-1 w dniu przyjęcia mogą spożywać do odwołania jedynie CZYSTE KLAROWNE PŁYNY!

- b. Leków używanych w celu kontroli glikemii z grupy agonistów GLP-1, stosowanych codziennie jako pobierany lek doustny lub iniekcja, zawierających liraglutyd, semaglutyd, lixisenatyd, eksenatyd (Saxenda, Victoza, Ozempic, Rybelsus, Lyxumia).

UWAGA!!! Leki te powinno się odstawić 1 dzień przed wyznaczoną datą przyjęcia do szpitala; odstawienie tych leków musi uwzględniać wskazania do ich stosowania i w razie wątpliwości odbywać się **w porozumieniu z diabetologiem prowadzącym lub lekarzem POZ**, z zastosowaniem w razie konieczności ew. zmiany leczenia na insulinoterapię okołoperacyjną.

Pacjenci leczeni agonistami GLP-1 w dniu przyjęcia mogą spożywać do odwołania jedynie CZYSTE KLAROWNE PŁYNY!

- c. Leków używanych w celu leczenia otyłości z grupy agonistów GLP-1, stosowanych w iniekcji 1 x w tygodniu, zawierających duleglutyd, semaglutyd, tirzepatyd, eksenatyd, liraglutyd (Mounjaro, Saxenda, Victoza, Ozempic, Wegovy, Bydureon).
UWAGA!!! Leki te powinno się odstawić co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą przyjęcia do szpitala; odstawienie tych leków musi uwzględniać wskazania do ich stosowania i w razie wątpliwości odbywać się w porozumieniu z lekarzem prowadzącym terapię otyłości lub lekarzem POZ.
 Pacjenci leczeni agonistami GLP-1 w dniu przyjęcia mogą spożywać do odwołania jedynie CZYSTE KLAROWNE PŁYNY!
- d. Leków przeciwcukrzycowych z grupy flozyn (inhibitory SGLT2), zawierających dapagliflozynę, empagliflozynę, ertugliflozynę, kanagliflozynę (Forxiga, Jardiance, Synjardy, Steglatro, Segluromet, Steglujan, Invokana).
UWAGA!!! Leki te powinno się odstawić co najmniej 2 dni przed wyznaczoną datą przyjęcia do szpitala; odstawienie tych leków musi uwzględniać wskazania do ich stosowania i w razie wątpliwości odbywać się w porozumieniu z diabetologiem prowadzącym lub lekarzem POZ, z zastosowaniem w razie konieczności ew. zmiany leczenia na insulinoterapię okołoperacyjną.
- e. Leków przeciwplatek, zawierających kwas salicylowy (Acard, Polocard, Bestpiryn, Acesan, Aspiryn Protect, Abrea, Alepton, Aspirin, Cardipirin, Cardioteva, Pluscard, Proficar).
UWAGA!!! Leki te powinno się odstawić 6 dni przed wyznaczoną datą przyjęcia do szpitala; odstawienie tych leków musi uwzględniać wskazania do ich stosowania i w razie wątpliwości odbywać się w porozumieniu z kardiologiem prowadzącym lub lekarzem POZ, z uwzględnieniem ew. terapii pomostowej.
- f. Leków przeciwplatek, zawierających clopidogrel (Plavix, Areplex, Plavocorin, Zyllt, Agregex, Clopidix, Carder, Clopidogrel, Clopidogrelum, DuoPlavin, Grepid, Hemafluid, Pegorel, Trombex, Vixam, Egitromb).
UWAGA!!! Leki te powinno się odstawić 5 dni przed wyznaczoną datą przyjęcia do szpitala; odstawienie tych leków musi uwzględniać wskazania do ich stosowania i odbywać się w porozumieniu z kardiologiem prowadzącym lub lekarzem POZ, z uwzględnieniem ew. terapii pomostowej.
- g. Leków przeciwplatek, zawierających ticlopidinę (Aclotin, Apo-Clodin, Iclopid, Ifapidin, Ticlid, Ticlo).
UWAGA!!! Leki te powinno się odstawić 9 dni przed wyznaczoną datą przyjęcia do szpitala; odstawienie tych leków musi uwzględniać wskazania do ich stosowania i odbywać się w porozumieniu z kardiologiem prowadzącym lub lekarzem POZ, z uwzględnieniem ew. terapii pomostowej.
- h. Leków przeciwplatek, zawierających prasugrel (Bewim, Effient, Efient).
UWAGA!!! Leki te powinno się odstawić 7 dni przed wyznaczoną datą przyjęcia do szpitala; odstawienie tych leków musi uwzględniać wskazania do ich stosowania i odbywać się w porozumieniu z kardiologiem prowadzącym lub lekarzem POZ, z uwzględnieniem ew. terapii pomostowej.
- i. Leków przeciwplatek, zawierających tikagrelor (Brilinta, Brilique, Possia).
UWAGA!!! Leki te powinno się odstawić 5 dni przed wyznaczoną datą przyjęcia do szpitala; odstawienie tych leków musi uwzględniać wskazania do ich stosowania i odbywać się w porozumieniu z kardiologiem prowadzącym lub lekarzem POZ, z uwzględnieniem ew. terapii pomostowej.
- j. Leków przeciwplatek, zawierających cilostazol (Cilostop, Cilozek, Decilosal, Noclaud, Pletal, Stepcil).
UWAGA!!! Leki te powinno się odstawić 4 dni przed wyznaczoną datą przyjęcia do szpitala; odstawienie tych leków musi uwzględniać wskazania do ich stosowania i odbywać się w porozumieniu z kardiologiem prowadzącym lub lekarzem POZ, z uwzględnieniem ew. terapii pomostowej.
- k. Leków przeciwplatek, zawierających dipirydamol (Brilinta, Brilique, Possia).
UWAGA!!! Leki te powinno się odstawić 5 dni przed wyznaczoną datą przyjęcia do szpitala; odstawienie tych leków musi uwzględniać wskazania do ich stosowania i odbywać się w porozumieniu z kardiologiem prowadzącym lub lekarzem POZ, z uwzględnieniem ew. terapii pomostowej.
- l. Leków przeciwkrzepliwych, zawierających warfaryn (Warfin).
UWAGA!!! Leki te powinno się odstawić 4 dni przed wyznaczoną datą przyjęcia do szpitala; odstawienie tych leków musi uwzględniać wskazania do ich stosowania i odbywać się w porozumieniu z kardiologiem prowadzącym lub lekarzem POZ, z uwzględnieniem ew. terapii pomostowej.
- m. Leków przeciwkrzepliwych, zawierających acenocoumarol (Acenokumarol, Sintrom).

UWAGA!!! Leki te powinno się odstawić 2 dni przed wyznaczoną datą przyjęcia do szpitala; odstawienie tych leków musi uwzględniać wskazania do ich stosowania i odbywać się w porozumieniu z kardiologiem prowadzącym lub lekarzem POZ, z uwzględnieniem ew. terapii pomostowej.

n. Leków przeciwkrzepliwych, zawierających fondaparynuks (Aruxtra).

UWAGA!!! Leki te powinno się odstawić 1 dzień przed wyznaczoną datą przyjęcia do szpitala; odstawienie tych leków musi uwzględniać wskazania do ich stosowania i odbywać się w porozumieniu z kardiologiem prowadzącym lub lekarzem POZ, z uwzględnieniem ew. terapii pomostowej.

o. Leków przeciwkrzepliwych, zawierających rivaroxaban (Xarelto), dabigatran (Pradaxa), apixaban (Eliquis), edoksaban (Lixiana), betriksaban (Bevyxxa).

UWAGA!!! Leki te powinno się odstawić 24 godziny przed przyjęciem do szpitala (pacjenci z niewydolnością nerek 48 godzin przed przyjęciem do szpitala); odstawienie tych leków musi uwzględniać wskazania do ich stosowania i odbywać się w porozumieniu z kardiologiem prowadzącym lub lekarzem POZ, z uwzględnieniem ew. terapii pomostowej.

p. Suplementów diety oraz preparatów ziołowych, a także preparatów zawierających nienasycone kwasy tłuszczowe omega.

UWAGA!!! Leki te powinno się odstawić na minimum 14 dni przed przyjęciem do szpitala.

6. Prosimy (ze względu na przygotowanie do zabiegu operacyjnego) o **niestosowanie lakieru do paznokci, manicure hybrydowego** itp. Zakaz ten podyktowany jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa Pacjentom na bloku operacyjnym (stosowanie pulsoksymetrów oraz innej aparatury monitorującej).

7. Prosimy o zapoznanie się z ulotką dotyczącą porad i ćwiczeń z zakresu fizjoterapii „Zalecenia dotyczące przygotowania do zabiegu operacyjnego przeprowadzanego na Oddziale Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi”, dostępnej w formie drukowanej w Poradni Chirurgii Onkologicznej Chorób Piersi (gabinet 2065) lub w formie elektronicznej na stronie internetowej Oddziału – adres poniżej.

8. Na terenie Oddziału i Szpitala obowiązuje zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu.

9. Co należy zabrać do szpitala:

- dokumentację medyczną - dotychczasowe wyniki badań, opisy, płyty CD (z badaniami takimi jak mammografia, rezonans, tomografia) zdjęcia, wypisy ze szpitali, konsultacje specjalistyczne!
- spis i zapas dotychczas przyjmowanych w domu leków specjalistycznych na 7 dni
- trzy komplety piżamy bawełnianej rozpinanej, zapas bielizny osobistej, ręczniki
- stanik bezfiszbinowy / sportowy / dobrze dopasowany
- przy planowanym zabiegu rekonstrukcji piersi należy zakupić w sklepie medycznym gorset kompresyjny wraz z pasem stabilizującym
- przy planowanym zabiegu przeszczepu tłuszczu (liposukcja) należy zakupić w sklepie medycznym pas brzuszny lub odzież uciskową w zależności od ustalonego z chirurgiem zakresu zabiegu
- pantofle i klapki pod prysznic, porannik i przybory toaletowe, kubek i sztućce.

10. W oddziale istnieje możliwość skorzystania z depozytu dla rzeczy wartościowych.

11. Informujemy o możliwości otrzymania pomocy ze strony psychologów i pracowników socjalnych w trakcie i jeszcze przed przyjęciem do Szpitala (kontakt poniżej).

Strona internetowa oddziału:

wco.pl/o-nas/struktura-szpitala/oddzialy/oddzial-chirurgii-onkologicznej-chorob-piersi

Telefony kontaktowe:

p.o. Ordynator – dr n. med. Piotr Nowaczyk (łączy Sekretariat) 61 8850 600 Sekretariat Oddziału: 61 8850 602 Dyżurka Lekarska: 61 8850 624	Dyżurka Pielęgniarska 61 8850 603 Piel. Oddziałowa – mgr Joanna Kaczmarek: 61 8850 328 Tel. do Pacjentów: 61 8850 604 Psycholog / pracownik socjalny – 61 8850 882
---	---

Pacjenci na naszym Oddziale korzystać mogą z bezprzewodowej sieci internetowej.